

Lentagran®

- Herbicide de postlevée
- Action de contact
- Anti-dicotylédones
- Utilisation seul ou en programme



Le maillon
indispensable du
désherbage de l'oignon,
de l'échalote et de l'ail

 **BELCHIM**
—Crop Protection—

Lentagran®

sur oignons,
échalotes et ail


Dose autorisée : 2 kg/ha

Stade des adventices à l'application et doses

Stade des adventices	Cotylédons/1 feuille	1 à 2 feuilles	3 à 4 feuilles
Dose (kg/ha) *	0,5 kg	1 kg	1,5 kg
Nb d'applications (**)	1 à 3	1 à 2	1

* À raisonner en fonction du stade des adventices et du stade de l'oignon / échalote.

** À raisonner en fonction des levées successives des adventices.



Traiter à partir du stade 2 feuilles vraies **Lentagran**

Fractionner les applications en 2 ou 3 fois (0,5 kg/ha à 0,7 kg/ha) dans le cadre d'un programme permet un meilleur contrôle des levées échelonnées des adventices.

Recommandations d'emploi

- Volume d'application : 200 à 600 l/ha.
- Appliquer de préférence sur feuillage sec et sur une plante en conditions poussantes.
- Après une pluie, attendre 48 heures minimum avant d'intervenir (présence indispensable de la cuticule cireuse de la culture).
- Ne pas mélanger avec des fertilisants foliaires, des adjuvants à base d'huile ou des herbicides anti-graminées.

Adapter votre programme de désherbage et vos doses en fonction de vos sols, de la période d'application, du stade et de l'état de la culture ainsi que des adventices à contrôler.

Caractéristiques techniques

DAR : appliquer avant le stade BBCH14 (4 feuilles vraies)

ZNT : 5 mètres

Délai de rentrée : 48 heures

Composition : 45 % de pyridate

Formulation : poudre mouillable (WP)

Famille des phenylpyridazines (HRAC : C3)